

日 薬 情 発 第 64 号  
平成 22 年 10 月 27 日

都道府県薬剤師会会长 殿

日本薬剤師会  
会長 児玉 孝

薬事・食品衛生審議会において事前評価された  
医薬品の適応外使用について

標記について、厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長より、別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。


本通知は、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請を行っても差し支えないとされたうちの3成分に関して、効能・効果等の追加申請がされる間の適応外使用について、日薬情発第 50 号にて通知いたしました「平成 22 年 8 月 30 日付薬食審査発 0830 第 9 号・薬食安発 0830 第 1 号」と同様の安全性の確保を求める通知になります。

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。


薬食審査発 1025 第 4 号  
薬食安発 1025 第 2 号  
平成 22 年 10 月 25 日

社団法人 日本薬剤師会 会長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長



厚生労働省医薬食品局安全対策課長



薬事・食品衛生審議会において事前評価された  
医薬品の適応外使用について


標記について、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部（局）長あて通  
知しましたので、御了知の上、貴会会員への周知方よろしくお願ひいたします。




薬食審査発 1025 第 3 号  
薬食安発 1025 第 1 号  
平成 22 年 10 月 25 日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長



厚生労働省医薬食品局安全対策課長



新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する  
事前評価を受けた医薬品の適応外使用について

薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については、平成 22 年 8 月 30 日付薬食審査発 0830 第 9 号・薬食安発 0830 第 1 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(以下「連名通知」という。)にて通知したところですが、平成 22 年 10 月 25 日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において、別添の医薬品について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされました。

つきましては、別添の医薬品について、連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただきますよう、貴管下関係医療機関及び関係製造販売業者に対する周知徹底及びご指導方よろしくお願ひいたします。

(別添)

1. 一般名：3-ヨードベンジルグアニジン (<sup>123</sup>I) 注射液  
販売名：ミオ MIBG-I123 注射液  
会社名：富士フィルム RI ファーマ株式会社  
追加される予定の効能・効果：腫瘍シンチグラフィによる褐色細胞腫の診断  
追加される予定の用法・用量：
  - 通常、本品 111MBq を静脈より投与し、24 時間後にガンマカメラを用いて腫瘍シンチグラムを得る。必要に応じて、6 時間後及び 48 時間後の腫瘍シンチグラムを得る。
  - なお、投与量は、年齢、体重等により適宜増減するが、222MBq を上限とする。
2. 一般名：アザチオプリン  
販売名：①イムラン錠 50mg  
          ②アザニン錠 50mg  
会社名：①グラクソ・スミスクライン株式会社  
          ②田辺三菱製薬株式会社  
追加される予定の効能・効果：
  - 治療抵抗性の下記リウマチ性疾患
  - 全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎、ウェグナー肉芽腫症、結節性多発動脈炎、Churg-Strauss 症候群、大動脈炎症候群等）、全身性エリテマトーデス（SLE）、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、および難治性リウマチ性疾患  
追加される予定の効能・効果に関する使用上の注意：  
副腎皮質ステロイド等との併用を考慮する旨  
追加される予定の用法・用量：  
全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎、ウェグナー肉芽腫症、結節性多発動脈炎、Churg-Strauss 症候群、大動脈炎症候群等）、全身性エリテマトーデス（SLE）、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、および難治性リウマチ性疾患の場合、1 日量として 1 ~ 2mg/kg 相当量を経口投与する。なお、症状により適宜増減可能であるが 1 日量として 3mg/kg を超えないこと。  
追加される予定の用法・用量に関する使用上の注意：  
本剤の治療効果が認められた際には効果を維持できる最低用量まで維持量を減量することを検討する旨
3. 一般名：エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）  
販売名：注射用ノボセブン、ノボセブン HI 静注用  
会社名：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社  
追加される予定の効能・効果：  
GP IIb-IIIa 及び／又は HLA に対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるグランツマン血小板無力症患者の出血傾向の抑制  
追加される予定の用法・用量：  
90μg/kg (80 ~ 120μg/kg) (4.5KIU/kg (4.0 ~ 6.0KIU/kg)) とし、2 時間 (1.5 ~ 2.5 時間) ごとに投与する。確実な止血のために、少なくとも 3 回投与する。  
追加される予定の用法・用量に関する使用上の注意：

持続注入では有効性が得られないことがあるため、推奨投与法はボーラス注射とする。

血小板輸血不応状態ではない患者の場合、グランツマン血小板無力症の第一選択療法は血小板輸血である。